



GÉRARD BADER

 RENNES

- ▶ Spécialiste en Chirurgie Orale, PhD
- ▶ Maître de Conférence des Universités
- ▶ Praticien hospitalier à Rennes
- ▶ Pratique libérale à Caen

VENDREDI 19 MAI - 15h00-15h15

La transplantation dentaire : une alternative dans la décision thérapeutique

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

La conduite à tenir devant une canine incluse ectopique mandibulaire peut, en général, se résumer à :

- L'abstention thérapeutique.
- L'extraction.
- La traction chirurgico-orthodontique.

Pour cette dernière option, une limite serait la position de la pointe de la dent par rapport au milieu de la symphyse. Au-delà, elle ne serait plus envisageable.

Une amélioration dans le protocole de transplantation dentaire, qui garantit une non-ankylose du greffon et permet donc de déplacer la dent après transplantation, semble être une quatrième voie. Nous avons réalisé plus d'une cinquantaine de ce type d'interventions avec un recul de plusieurs années pour certaines, avec des résultats très positifs et reproductibles. Elle peut être utilisée en cas d'échec de traction. C'est ce protocole que nous nous proposons de vous présenter.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▶ **Analyser** : c'est la première action à mener devant ce type de situation clinique, grâce à l'anamnèse et à l'imagerie.
- ▶ **Évaluer** : évaluer les difficultés en fonction des données recueillies, clinique et radiologique.
- ▶ **Appliquer** : choisir la solution thérapeutique la plus adaptée au cas, celle qui offre le plus de chance de succès pour le patient.