

PARTIE 2

DE L'INCISIVE  
TRAUMATISÉE  
À LA MOLAIRE  
COMPROMISE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  
2023 / WORLD TRADE  
CENTER  
MARSEILLE



Sylvie  
**LEGRIS**  
[ BEAUVAIS ]

CV

- Docteur en chirurgie dentaire, Spécialiste qualifiée en ODF (CECSMO Paris 7)
- DIU Traitement Odonto-Stomatologique SAOS Paris
- Attachée Centre de Référence des Malformations Rares de la Face et de la Cavité Buccale, Paris-Rothschild, AP-HP
- Attachée Service ODF, Pitié Salpêtrière, AP-HP
- Chargée de cours UFR d'Odontologie, Paris Cité



Arabelle  
**VANDERZWALM**  
**GOUVERNAIRE**  
[ PARIS ]

CV

- Maître de Conférences des Universités, Université Paris Cité
- Praticien Hospitalier de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- Responsable du CES d'Odontologie Pédiatrique-Prévention de l'Université Paris Cité

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2023  
[ 16h00 ▶ 16h30 ]

*Comment remplacer les dents  
compromises du secteur antérieur  
de l'enfant à la fin de la croissance ?*

Résumé de la conférence

Un enfant peut être amené à perdre une incisive permanente, centrale ou latérale, après un traumatisme. C'est le cas de l'expulsion quand la dent n'est pas retrouvée, ou de la fracture corono-radicaire qui nécessite l'extraction immédiate. Mais, le plus souvent, c'est bien après le traumatisme, à la suite d'une période de temporisation avec tentative de maintien sur l'arcade, que la dent traumatisée est extraite. Cette perte précoce a deux conséquences majeures : l'esthétique largement perturbé et la perte d'espace qui peut être très rapide compte tenu des phénomènes de dentition. La problématique de cette situation chez l'enfant et/ou l'adolescent est que ce sont des individus en croissance. Chez l'enfant en denture mixte, un simple arc palatin avec une dent prothétique sera suffisant en attendant un éventuel traitement orthodontique. Celui-ci devra tenir compte de la future réhabilitation prothétique et ménager un espace suffisant en évitant un excès de recouvrement antérieur. En denture adulte, jeune plusieurs possibilités thérapeutiques existent dont le choix dépend du contexte parodontal et occlusal. Mais il sera toujours réalisé selon le principe du bridge collé sans préparation des dents adjacentes.

Objectif de la conférence

- Connaître les différentes possibilités de réhabilitation prothétiques chez l'enfant et l'adolescent après la perte d'une incisive maxillaire.