



**Gil
TIRLET**
[INSERM, PARIS]

CV

- ▶ Docteur en chirurgie dentaire
- ▶ Ancien MCU-PH (Dept de Prothèse Paris V) et Praticien Hospitalier (Charles Foix, Ivry)
- ▶ Praticien Libéral à Paris depuis 1986
- ▶ Fondateur des Bioteam nationales
- ▶ Membre du Groupe Bioemulation International
- ▶ Spécialisé en Dentisterie Biomimétique, Adhésive et Esthétique

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2025
[13h30 ▶ 13h50]

PARTIE 3 : RÉHABILITATIONS PROTHÉTIQUES

Les bridges collés cantilever antérieurs en céramique : l'heure de la maturité clinique

Résumé de la conférence

Depuis la première réalisation en 2006 (Dr JP Attal) à la suite d'une première publication du Pr Mathias Kern de l'Université de Kiel en Allemagne, notre engouement pour cette thématique « contre intuitive » au départ a été croissant au fil de ces 19 dernières années. Nous avons ainsi réalisé, en pratique privée mais également hospitalo-universitaire, près de 200 réalisations à ce jour avec deux matériaux principaux : le Disilicate de lithium et la Zircone. Nous présenterons, dans le cadre de cette conférence au format très court, des situations illustrant ces cantilevers antérieurs, réalisés depuis 2008, avec le suivi clinique sur plusieurs années. Ils permettront d'appréhender l'ensemble des possibilités de cette thérapeutique adhésive contemporaine. Les recommandations des cantilever en antérieur s'orientent aujourd'hui de plus en plus vers l'utilisation de la zircone 3Y-TZP avec microstratification, même si les résultats sur le disilicate de lithium sont excellents sur ces 15 dernières années. Leur maturité et leur longévité clinique permettent aujourd'hui d'aborder des situations de plus en plus difficiles. Enfin, nous soulignerons l'importance d'une collaboration étroite avec l'orthodontiste, dans le cadre des traitements mixtes, qui reste capitale pour assurer leur succès clinique.

Le bridge collé cantilever en céramique s'est ainsi positionné et finalement imposé au fil des années comme une thérapeutique alternative, subtile et fiable, à l'implant unitaire antérieur.

Objectifs pédagogiques

- ▶ Les recommandations en antérieur s'orientent de plus en plus vers l'utilisation de la zircone 3Y-TZP avec microstratification, même si les résultats sur le disilicate de lithium sont excellents sur ces 15 dernières années.
- ▶ La maturité clinique des cantilevers permet aujourd'hui d'aborder des situations de plus en plus difficiles.
- ▶ L'importance de la collaboration avec l'orthodontiste.