

J'Y SERAI ET VOUS ?



BEATRIZ

CASTANEDA

Paris

- Praticienne Hospitalière,
Service de Stomatologie
de l'Hôpital La Pitié-Salpêtrière
- Spécialiste qualifiée en ODF
- Docteur en Sciences Biologiques
- Habilitée à la Direction
de Recherches
- Ancien Professeur de l'Université
Paris Diderot



VENDREDI 8 MAI 2026

9h40 > 10h00

Les défauts primaires d'éruption : diagnostic et traitement

L'altération de l'éruption des molaires permanentes est un phénomène rare dont la prévalence augmente néanmoins avec les années. Parmi ces atteintes, se distinguent d'une part les impactions où les dents sont bloquées dans leur chemin d'éruption par un obstacle mécanique, et d'autre part les rétentions (primaires) correspondant à un arrêt de l'éruption de la dent en l'absence de barrière physique dans son chemin d'éruption. Le défaut primaire d'éruption (PFE : Primary Failure of Eruption) est une rétention primaire affectant sévèrement une dent avec des répercussions sur les dents adjacentes. La rétention primaire et le défaut primaire d'éruption seront présentés en abordant dans chaque cas les volets diagnostic (paramètres cliniques et radiologiques) et thérapeutique afin de mieux diagnostiquer et prendre en charge les patients.

OBJECTIFS

- Connaître les points-clés du diagnostic clinique.
- Etablir les différences de prise en charge entre la rétention primaire et le défaut primaire d'éruption.

