

LA VACCINATION ANTI-GRIPPALE: EVALUATION DANS UNE POPULATION ÂGÉE FRAGILE AU DOMICILE

Thibaud Morlan ¹, Véronique Lachat ¹, Aurélie Tahar Chaouche ¹
¹Unité de Gériatrie Communautaire, Service de Gériatrie et de Réadaptation, Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Suisse

INTRODUCTION

La grippe saisonnière constitue une cause importante de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées, en particulier chez celles présentant des comorbidités ou une perte d'autonomie. La vaccination antigrippale annuelle demeure le principal moyen de prévention des formes graves, des hospitalisations et des décès liés à la grippe. Malgré les recommandations en vigueur, la couverture vaccinale reste insuffisante dans cette population, notamment en raison de réticences ou de refus de vaccination. Selon l'OMS, chez les personnes fragiles, la couverture devrait être de 95 % afin d'éviter d'éventuelles conséquences négatives. De nombreuses études ont été portées sur les populations en institution mais peu d'entre elles se concentrent spécifiquement sur la population de personnes âgées suivies à domicile, où l'accès aux soins peut être plus limité.

OBJECTIFS

Cette étude a pour but d'évaluer le taux de vaccination grippale, les motifs de refus, sa tolérance (dans les 72h) et les événements graves observés au cours du suivi, dans une population âgée confinée au domicile.

MÉTHODE

Etude rétrospective observationnelle portant sur les patients suivis à domicile par l'Unité de Gériatrie Communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) d'octobre 2025 à avril 2026. La vaccination antigrippale a été réalisée conformément aux recommandations nationales en vigueur en tenant compte du type de vaccin indiqué pour chaque patient. Les données portent sur la campagne de vaccination 2025 réalisée en collaboration avec les services de soin à domicile. Les données de tolérance et les motifs de refus ont été recueillis, selon une liste prédéfinie, par les infirmiers des patients ou par les médecins pour les patients sans aide à domicile. Les caractéristiques cliniques, démographiques et les données d'hospitalisations et de décès pour grippe ont été extraites des dossiers patients.

RÉSULTATS

- L'étude a porté sur 577 patients, 83.8 ans en moyenne, 61.53% de femme
- Le taux de vaccination est de 55.81%.
- 84.33% ont été vaccinés par le vaccin à haute dose, 8.26% par un vaccin trivalent standard et 7.41% par un vaccin dont la dose n'était pas précisée
- Les motifs de refus n'ont pas été explorés chez 113 patients (58.85%)
- Le manque de confiance apparaît comme la raison principale de refus de vaccination (Tableau 1). A noter que 22.58 % des refus le sont pour une raison indéterminée, souvent chez les patients incapables de discernement ou ne pouvant communiquer leur avis
- Aucun effet secondaire n'a été rapporté chez les patients vaccinés avec la dose standard et 6 (1.69 %) chez les patients vaccinés avec la haute dose (Tableau 2)

- Au cours du suivi, 80 patients sont décédés dont 4 suite à la grippe (5%)
- Il y a eu 352 hospitalisations dont 16 suite à une grippe (4.55%)

CONCLUSION

- La couverture vaccinale de 56% reste inférieure à celle recommandée par l'OMS mais en adéquation avec la littérature. La tolérance est bonne, quel que soit le vaccin administré.
- L'exploration des motifs du refus de vaccination n'est pas exploré dans la majorité des cas ce qui pourrait pourtant mener à des actions concrètes pour améliorer la couverture vaccinale dans cette population à risque.
- L'efficacité vaccinale est en cours d'analyse.

Motifs de refus	N (%)
Manque de confiance	54 (58.07%)
Trop contraignant	6 (6.45%)
Complaisance	12 (12.90%)
Responsabilité collective	0 (0%)
Ne sait pas	21 (22.58%)

Tableau 1 : Motifs de refus de la vaccination antigrippale

	Vaccin dose standard N (%)	Vaccin à haute dose N (%)
Réactions locales	0	4 (66.66%)
Arthromyalgies	0	1 (16.67%)
Etats fébriles	0	1 (16.67%)

Tableau 2 : Effets secondaires dans les 72h post vaccination