

Intervention d'un pharmacien clinicien aux équipes mobiles de gériatrie



H. Riviere^{1, 2}, M. Corvaisier^{2, 3}, G. Dorquin², C. Vergnaud², L. Radou², S. Couzinet²,
A. Brangier^{1, 2}, C. Annweiler^{2, 4}

¹ Praticien hospitalier, service de médecine gériatrique, CHU d'Angers
² Université d'Angers
³Pharmacien clinicien, service de médecine gériatrique, CHU d'Angers
⁴ Professeur hospitalo-universitaire, service de médecine gériatrique, CHU d'Angers

Contexte :

Une personne âgée de plus de 75 ans sur deux est hospitalisée à la suite d'un passage aux urgences selon les derniers résultats de l'observatoire régionale de la santé des Pays de Loire. Les patients âgés sont plus à risque d'événement indésirable médicamenteux au cours de leur hospitalisation et la participation d'un pharmacien hospitalier clinicien participe à la réduction de la iatrogénie. Ainsi, l'objectif de notre étude a été d'évaluer l'impact d'un pharmacien clinicien au sein des équipes mobiles de gériatrie (EMG) du CHU d' Angers en 2025.

Méthode :

Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective, monocentrique CHU d'Angers du 1er janvier au 30 septembre 2025. Le pharmacien clinicien intervenait pour un bilan de médication lors des interventions de l'équipe mobile de gériatrie intrahospitalière au service d'accueil des urgences mais également à l'équipe mobile fragilités EHPAD intervenant dans les domiciles institutionnelle (EHPAD, résidences autonomie ou service) d'Angers Loire Métropole.


Résultats :

Sur la période concernée, 82 patients ont pu bénéficier de l'intervention du pharmacien clinicien. 32 soit 39 % au service d'accueil des urgences pour l'EMG intrahospitalière, 50 soit 61 % pour l'EMG extrahospitalière. 62,2 % d'entre eux étaient des femmes et la moyenne d'âge était de 87,3 ans.

Intervention pharmaceutique (IP) :

- 76,8 % des patients ont pu bénéficier d'au moins 1 IP
- 53,7 % des patients au moins 2 IP
- et 14,6 % plus de 4 IP

Moyenne de 2,3 IP par patient



Conclusion :

La démarche pluridisciplinaire entre équipe mobile de gériatrie et le pharmacien clinicien a permis d'enrichir les interventions et les préconisations médicamenteuses afin de diminuer les événements iatrogènes potentielles des patients évalués.